

Andrzej Rocz*

Argumenty na rzecz kreacjonizmu starej Ziemi

1. Węgiel kamienny. Aby mogła powstać metrowa warstwa węgla kamiennego, materiał na taką ilość węgla musi rosnać jako las 1200 lat. Jeden z pokładów węgla w Zagłębiu Ekibastuskim w Kazachstanie ma 92 m grubości. Pokład Reden w Zagłębiu Górnośląskim ma 28 m. Przekrój przez złożę węglonośne ma budowę warstwową i składa się np. z następujących po sobie warstw: piaskowiec, węgiel, łupek, piaskowiec, łupek, węgiel, łupek, wkładka pochodzenia morskiego, łupek, węgiel, łupek stigmariowy, piaskowiec itd." ¹ Jak powstawały te warstwy???

2. Torf. 1 cm warstwy torfu powstaje z materiału, który rośnie 20 lat.

3. Ropa naftowa. "Ropa naftowa powstaje w wyniku procesu bitumizacji, (...) substancji organicznych znajdujących się w wodzie morskiej". ² Ile organizmów musiało zginąć, aby powstały tak olbrzymie

* Andrzej Rocz posiada wyższe wykształcenie techniczne i mieszka w Bielsku-Białej. Jego wcześniejsze artykuły, w których bronił kreacjonizmu starej Ziemi, ukazały się w *Na Początku...* 1995, nr 9 (61) oraz 1996, nr 3 (69).

¹ Marian Książkiewicz, **Geologia dynamiczna**, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1954, s. 231.

² Halina Radlicz-Rühlowa i Maria Wiśniewska-Żelichowska, **Podstawy**

ilości ropy naftowej???

4. Skamieniałości. Znalezione całe miliony skamieniałości nie występujących już dzisiaj organizmów. Aby powstały skamieniałości, potrzeba milionów lat. Np. brak skamieniałości człowieka współczesnego.

5. Skały osadowe pochodzenia organicznego. W ciągu roku organizmy wytwarzają warstwę osadów grubości 1 mm. Wielka Rafa Koralowa ma grubość 800 m.

6. Kolejność warstw.

7. Kalendarz lodowy. Śnieg padający w okolicach podbiegunowych nie topnieje i zostaje sprasowany do postaci lodu przez warstwy śniegu znajdujące się powyżej. Pyłki kwiatowe i inne drobne pyły (np. z wybuchu wulkanów), krążąc z wiatrami kontynentalnymi opadały wraz ze śniegiem. W 1993 roku zakończono wiercenie lodu na Grenlandii. Udało się zejść na głębokość 3025 m. Najstarsze, wydobyte z samego dna próbki pochodzą sprzed 250 tysięcy lat i zawierają pyłki roślinne.³

8. Zwierzęta żyjące w Australii. Okres pojawienia się torbaczy był jednocześnie czasem, w którym Australia straciła kontakt z kontynentem. Jak inaczej wytłumaczyć brak w Australii zwierząt bardziej rozwiniętych?

9. Pomiar czasu metodą pierwiastków promieniotwórczych.

Powyższy materiał został przedstawiony bardzo skrótowo i wiele wątków zostało całkiem pominiętych. Myślę, że pozwala on przywrócić Biblii należną jej pozycję wśród ludzi i stanowi dobrą płaszczyznę do wznowienia dyskusji światopoglądowej z przedstawicielami nauki. Chętnie bym poznał uwagi krytyczne do powyższego tekstu. Uważam, że przyjęcie przedstawionej egzegezy rozwiązuje zdecydowaną większość problemów, jakie dzisiaj mają kreacjoniści.

Andrzej Rocz

geologii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, wydanie II, Warszawa 1988, s. 58.

³ Czytanie w lodzie, *Wiedza i Życie* nr 11/93.